



BOLLETTINO SPECIALE SCOPAZZI DEL MELO

Lotta a *Cacopsylla melanoneura* vettore degli scopazzi del melo

Per il contenimento degli scopazzi del melo risulta fondamentale il **controllo degli insetti vettori** tramite difesa insetticida e **l'eliminazione tempestiva delle piante che presentano i sintomi della malattia** (<https://fitoemergenze.fmach.it/scopazzi-del-melo>).

La delibera della G.P. n. 1442 del 26 settembre 2025 **conferma l'obbligatorietà dell'esecuzione degli interventi insetticidi contro gli insetti vettori su tutto il territorio provinciale** indipendentemente dal metodo di conduzione del frutteto, seguendo le indicazioni del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach.

Il monitoraggio delle psille dell'ultima settimana evidenzia la presenza di *C. melanoneura*. Le psille iniziano a nutrirsi sul melo fin dai primi stadi vegetativi e quindi possono trasmettere da subito il fitoplasma degli scopazzi. Considerando l'elevato inoculo di scopazzi presente nei frutteti, il numero di individui di psille rilevato in questi giorni e il veloce avanzamento fenologico è necessario intervenire per il contenimento di questi insetti rispettando le modalità di seguito riportate.

FRUTTETI A CONDUZIONE INTEGRATA

Momento indicativo di intervento: intervenire nei prossimi giorni e comunque entro la metà di marzo, dando precedenza ai frutteti posti in areali di fondo valle o in zone precoci.

Principi attivi consigliati:

- **Etofenprox**
- **Piretrine** (consentito in agricoltura biologica)
- **Taufluvalinate**

Rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta dei diversi formulati commerciali.

FRUTTETI A CONDUZIONE BIOLOGICA (E IN CONVERSIONE)

Momento indicativo di intervento: intervenire nei prossimi giorni e comunque entro la metà di marzo, dando precedenza ai frutteti posti in areali di fondo valle o in zone precoci.

Principi attivi consigliati:

- **Piretrine**

Rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta dei diversi formulati commerciali.