



BOLLETTINO DIFESA INTEGRATA DI BASE

La stagione invernale a cavallo tra il 2025 e il 2026 è stata caratterizzata da un dicembre più asciutto e caldo rispetto alla media climatica, seguito da un gennaio in controtendenza, complessivamente fresco e decisamente piovoso, e da un febbraio eccezionalmente caldo (il secondo più caldo degli ultimi 20 anni, superato solo dal record del 2024). La piovosità dei primi mesi del 2026 è stata invece più alta della media climatica, con eventi di carattere nevoso che si sono registrati anche in alcuni fondovalle. Nel complesso, l'inverno appena trascorso è risultato più caldo della media climatica di quasi 1 °C. Le temperature del mese di marzo sono state superiori alla media, mentre la piovosità inferiore. Nell'ultima parte del mese e nei primi giorni di aprile molte giornate sono state caratterizzate da vento, talvolta molto forte. Le temperature del mese sono state superiori alla media, mentre le piogge inferiori. La prima parte del mese di maggio è stata caratterizzata da diverse giornate piovose che hanno registrato oltre 50 mm di pioggia, le temperature sono rimaste sotto la media fino all'ultima settimana per poi raggiungere valori tipicamente estivi e quindi sopra la media. I primi giorni di giugno sono stati piovosi, con oltre 90 mm di pioggia, valore superiore alla media dell'intero mese. Nell'ultima parte le temperature sono state molto elevate e le piogge abbondanti, assumendo in diversi casi carattere temporalesco. Luglio, al momento, registra temperature sopra la media.

	Temperatura*	Piovosità*
DICEMBRE	Superiore alla media (3°C)	Inferiore alla media (10 mm)
GENNAIO	Inferiore alla media (0,5°C)	Superiore alla media (62 mm)
FEBBRAIO	Superiore alla media (6,6°C)	Superiore alla media (64 mm)
MARZO	Superiore alla media (10,5°C)	Inferiore alla media (35 mm)
APRILE	Superiore alla media (15,3°C)	Inferiore alla media (29 mm)
MAGGIO	Superiore alla media (17,8°C)	Inferiore alla media (54 mm)
GIUGNO	Superiore alla media (23,1°C)	Superiore alla media (133 mm)
LUGLIO	Superiore alla media (prima decade)	Inferiore alla media (prima decade)

*dati stazione meteo di S. Michele all'Adige riferiti alla media degli ultimi 20 anni.

Per consultare i dati meteo: <https://meteo.fmach.it/>



MELO

Tutte le zone

Ticchiolatura

Nel prossimo periodo è possibile effettuare un'efficace difesa dalla ticchiolatura intervenendo con prodotti ad azione preventiva ad intervalli variabili in funzione della sensibilità varietà, della percentuale di ticchiolatura presente nel frutteto, delle piogge previste e di eventuali dilavamenti.

Intervenire indicativamente:

- ogni 15-20 giorni su varietà sensibili;
- ogni 20-25 giorni su varietà poco sensibili;
- su varietà resistenti porre attenzione alla difesa da funghi secondari (*Marssonina coronaria*, *Venturia asperata*, ecc.).

Colpo di fuoco batterico

Nell'ultimo periodo è stato riscontrato qualche caso di colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*).

La sorveglianza dei frutteti è di fondamentale importanza al fine di individuare tempestivamente le piante colpite. Si consiglia quindi di procedere alla verifica delle piante messe a dimora nel 2026 ponendo particolare attenzione anche a quelle piantate in sostituzione delle fallanze.

Qualora ci fossero ancora piante con fiori aperti è importante rimuoverli manualmente.

In questo periodo la comparsa dei sintomi è in continua evoluzione, è pertanto importante monitorare i frutteti con frequenza (ogni 7 giorni).

La presenza (anche sospetta) di piante sintomatiche deve essere comunicata immediatamente al Servizio Fitosanitario Provinciale all'indirizzo e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it

Successivamente è necessario procedere alla pulizia degli impianti dal materiale infetto.

Maggiori informazioni e la guida al riconoscimento dei sintomi è disponibile al link

<https://fitoemergenze.fmach.it/colpo-di-fuoco>



Sintomi di colpo di fuoco batterico

Cimice asiatica

La cimice asiatica è un insetto estremamente dannoso e difficile da contenere. Caratterizzata da una spiccata polifaga, si nutre e si sviluppa a carico di moltissime specie erbacee, arbustive, arboree (tra cui il melo) e ornamentali e nei mesi invernali trova riparo negli ambienti antropizzati (abitazioni, tettoie, magazzini, ecc.), dove sverna come adulto. Questa sua polifagia rende estremamente difficoltoso il monitoraggio della popolazione.



Ovatura e giovani di nuova
generazione



Stadio giovanile



Adulto

È fondamentale che ogni frutticoltore verifichi la presenza di cimici soprattutto nei meleti delle varietà più sensibili e dove nelle scorse annate si sono verificati danni.

Zone di collina

Stadio fenologico

Nelle zone più precoci si rilevano frutticini di diametro medio 58-63 mm, mentre nelle zone più tardive 45-50 mm.

Afide lanigero

Nelle situazioni problematiche, prima di intervenire con prodotti specifici, si consiglia di adottare tutte le pratiche agronomiche per contenere lo sviluppo dell'afide (es. potatura verde, sfalcio del sottofilare, ecc.) e monitorare l'evoluzione dell'infestazione verificando anche lo stato di parassitizzazione delle colonie. Qualora queste pratiche non fossero sufficienti è possibile intervenire con un prodotto specifico.

Zone di fondovalle

Stadio fenologico

Siamo allo stadio fenologico di ingrossamento frutticini, l'accrescimento medio giornaliero è di circa 0,5 mm al giorno.

Carpocapsa e *Cydia molesta*

Per una corretta strategia di difesa sono fondamentali i controlli in campo. I rilievi vengono effettuati osservando 500 frutti per appezzamento, in particolare nelle zone più problematiche e nei frutteti che presentavano forte attacco l'anno precedente. Superata la soglia di 0,5% di frutti con penetrazioni attive di carpocapsa, intervenire con prodotti specifici.



ACTINIDIA

Stadio fenologico

Lo stadio attuale è di accrescimento frutti.

In previsione di precipitazioni è possibile effettuare una difesa preventiva da PSA con prodotti specifici alternandoli tra loro.

Solo in caso di eventi grandinigeni è possibile l'impiego di prodotti a base di rame.

In questi giorni va eseguito il trattamento per il contenimento delle cimici con prodotti specifici.

SUSINO

Stadio fenologico

In tutte le zone il susino si trova in fase di accrescimento.

Qualora vi fossero degli eventi grandinigeni è possibile intervenire preventivamente con un prodotto rameico, registrato su susino in vegetazione, per la difesa dalla batteriosi.

Per limitare il diffondersi del virus Sharka, del quale ora si rendono visibili i sintomi, effettuare un controllo dei propri frutteti ed estirpare le piante infette.

OLIVO

Stadio fenologico

Sia nelle zone di fondovalle che di collina siamo nello stadio fenologico di accrescimento dei frutti.

Mosca olearia

In questo periodo le catture del dittero sono in aumento nelle stazioni di monitoraggio dove non viene praticato nessun contenimento dell'insetto.

In questo stadio fenologico la drupa non è ancora sensibile alla *Bactrocera oleae*.

Pertanto, è fondamentale:

- sostituire i vecchi dispositivi utilizzati per la cattura di massa del dittero con quelli nuovi; una esposizione delle trappole, sia nelle olivete che nei centri urbani, aiuta a ridurre la popolazione estiva di questo insetto;
- iniziare il monitoraggio aziendale. Questo permette di valutare l'entità della popolazione del dittero nel proprio oliveto e l'efficacia della gestione dell'insetto intrapresa.

Cimice asiatica

Dal monitoraggio rileviamo che la popolazione svernante di *Halyomorpha halys* si sta esaurendo.



***Euzophera* spp.**

Il volo rilevato questa settimana del lepidottero *Euzophera* spp. (*E. pinguis/bigella*) è molto basso.

Cocciniglia mezzo grano di pepe

La cocciniglia mezzo grano di pepe è un parassita abbastanza diffuso negli oliveti, favorito dal clima fresco e umido. In genere durante il periodo estivo viene facilmente contenuta da imenotteri parassitoidi.

Gravi attacchi di cocciniglia mezzo grano di pepe, che interessano l'intero oliveto, portano alla formazione di melata e successivamente allo sviluppo di fumaggine.

Si consiglia di intervenire nelle prossime settimane, alla fuoriuscita delle neanidi dagli scudetti solo nei casi dove si sviluppa un'abbondante melata.

Altre cocciniglie

Sono presenti, in modo sparso sul territorio, ma non necessitano di una difesa specifica.

Rogna dell'olivo e grandine

Gli eventi grandinigeni, che provocano danni ai tessuti vegetali, favoriscono la diffusione della Rogna. Entro 48 ore dalla grandinata distribuire prodotti specifici per evitare il diffondersi di questa patologia batterica.

Drosophila suzukii

I risultati del monitoraggio territoriale 2026 evidenziano una popolazione di adulti, da fine inverno ad oggi, elevata. In considerazione di questa situazione, si invitano gli agricoltori a porre grande attenzione nell'applicare tutti gli strumenti di controllo a disposizione, in particolare la gestione delle reti antinsetto. Si raccomanda la chiusura degli impianti in presenza di frutti ancora verdi, prendendo a riferimento la varietà più precoce nell'impianto, dal momento che la sensibilità inizia già con i primi accenni alla colorazione rosa. La protezione con reti è garantita soprattutto laddove l'impianto è chiuso più ermeticamente possibile; pertanto, si invitano i produttori a ridurre le aperture eccessivamente ampie (ad esempio grandi spazi tra i teli antipioggia, spazi tra teli e rete laterale, capezzagne non protette nei sistemi monoblocco, ecc.) dalle quali possono con maggiore facilità entrare adulti del moscerino dall'esterno.

I parassitoidi, costantemente monitorati dai tecnici della Fondazione Mach, si stanno sviluppando naturalmente, in particolare *Leptopilina japonica* che parassitizza le larve e contribuisce a limitare la popolazione di *Drosophila suzukii*. Per favorire questi parassitoidi può essere utile installare l'Augmentorium nei propri appezzamenti (<https://ctt.fmach.it/Divulgazione/Editoria/Drosorium>).



FRAGOLA

Intervenire per la difesa dall'oidio e botrite.

Controllare la presenza di antonomo, tripidi e *Lygus*. In caso di presenza di adulti di antonomo eseguire delle "battiture" serali scuotendo le foglie e raccogliendo gli insetti di antonomo che si lasciano cadere con il meccanismo della tanatosi.

Valutare l'introduzione di insetti utili, come predatori di tripidi e/o ragnetto rosso anche in modalità preventiva.

Eseguire la difesa e le corrette pratiche agronomiche per il contenimento delle infezioni dell'oidio.

Nel caso di interventi con prodotti fitosanitari per la difesa, utilizzare formulati autorizzati in etichetta per queste patologie e non superare le dosi massime consentite. Prima di eseguire gli interventi tagliare il prato sottostante al filare qualora vi siano essenze in fiore; quest'operazione va svolta fuori dal volo delle api. Trattare in giornate miti, senza vento e nelle prime ore del mattino o in tarda serata per rispettare il volo degli insetti pronubi.

Controllare la conducibilità del substrato e del drenato.



Maturazione fragola fuori suolo

LAMPONE

Controllare lo stato delle piante e la fase fenologica, che varia in funzione dell'altitudine e della data di esposizione delle piante. Per il lampone unifero fuori-suolo in molti impianti è già in atto la raccolta e in altri è già finita, mentre per il lampone rifiorante (produzione autunnale) stanno crescendo bene i polloni.

Verificare l'eventuale presenza di afidi sui nuovi germogli e sulle foglie per valutare un intervento e verificare anche la presenza di forficule. Dall'inizio comparsa dei boccioli fiorali controllare la presenza di antonomo. Iniziare a verificare anche la presenza di

ragno rosso. Nel caso di impiego di insetti utili (predatori e parassitoidi) per il contenimento di afidi, di ragno rosso, ecc., programmare i lanci fin da subito per favorire il loro insediamento e permettere l'espletamento della loro funzione di controllo. Si ricorda che la biodiversità delle specie di insetti utili impiegata è fondamentale e quindi più specie si rilasciano più la strategia di controllo risulterà efficace; inoltre vanno evitati i trattamenti insetticidi o quantomeno va verificata la compatibilità per non vanificare l'effetto degli ausiliari.

Nel caso di interventi con prodotti fitosanitari per la difesa, utilizzare formulati autorizzati in etichetta per queste patologie e non superare le dosi massime consentite. Prima di eseguire gli interventi tagliare il prato sottostante al filare qualora vi siano essenze in fiore; quest'operazione va



Maturazione lampone unifero



svolta fuori dal volo delle api. Trattare in giornate miti, senza vento e nelle prime ore del mattino o in tarda serata per rispettare il volo degli insetti pronubi.

Controllare la conducibilità del substrato e del drenato.

RIBES

Per programmare il corretto momento di raccolta monitorare la maturazione dei grappoli e il grado zuccherino degli acini. In molti impianti la raccolta è già iniziata.

Proseguire con un'adeguata strategia di difesa antioidica, per minimizzare le infezioni di oidio.

Inoltre, con la vegetazione diradata migliora anche la distribuzione dei prodotti fitosanitari nell'esecuzione di trattamenti sia con atomizzatore che con lancia a mano.

Verificare l'eventuale presenza di afidi sui nuovi germogli e sulle foglie per valutare in tempo un possibile intervento con i prodotti disponibili.

Nel caso di interventi con prodotti fitosanitari per la difesa, utilizzare formulati autorizzati in etichetta per queste patologie e non superare le dosi massime consentite. Prima di eseguire gli interventi tagliare il prato sottostante al filare qualora vi siano essenze in fiore; quest'operazione va svolta fuori dal volo delle api. Trattare in giornate miti, senza vento e nelle prime ore del mattino o in tarda serata per rispettare il volo degli insetti pronubi.



Maturazione ribes rosso

MIRTILLO

Per le varietà tardive monitorare le fasi di invaiatura e maturazione, controllando costantemente la chiusura delle reti per la difesa dalla *Drosophila suzukii*. Per varietà medio-tardive, che sono ora già mature, verificare costantemente la corretta e completa chiusura delle reti antinsetto. Nei casi in cui non siano presenti, provvedere ad un'adeguata difesa e attenta gestione della raccolta. La chiusura con reti antinsetto è utile anche a evitare i danni degli uccelli sui frutti.

La raccolta delle varietà precoci come Duke è già terminata in quasi tutti gli areali, mentre Valor, Cargo, Blue Ribbon, Top-self, ecc. sono in piena raccolta.

Nel caso di trattamenti con prodotti fitosanitari, utilizzare formulati autorizzati in etichetta per queste patologie e non superare le dosi massime consentite. Prima di eseguire gli interventi tagliare il prato sottostante al filare qualora vi siano essenze in fiore; quest'operazione va svolta fuori dal



*Danni da uccelli
sui frutti di mirtillo*



volo delle api. Trattare in giornate miti, senza vento e nelle prime ore del mattino o in tarda serata per rispettare il volo degli insetti pronubi.

Per mantenere la pianta in salute, avere cura della corretta gestione idrica e non concimare più negli impianti in suolo mentre è importante controllare la conducibilità del substrato nel caso di impianti fuori suolo.

MORA

Monitorare le fasi di invaiatura e maturazione per programmare la chiusura con le reti per la difesa dalla *Drosophila suzukii*.

Continuare la difesa antiperonosporica, sospendendola 20 giorni prima dell'inizio della raccolta che sarà diversa in base all'altitudine e alla varietà coltivata.

Verificare l'eventuale presenza di afidi sui nuovi germogli e sulle foglie per valutare per tempo un intervento con i prodotti disponibili. Iniziare a verificare anche la presenza di ragno rosso.

Nel caso di impiego di insetti utili (predatori e parassitoidi) per il contenimento di afidi, di ragno rosso, ecc., programmare i lanci

fin da subito per favorire il loro insediamento e permettere l'espletamento della loro funzione di controllo. Vanno evitati i trattamenti insetticidi o quantomeno va verificata la compatibilità per non vanificare l'effetto dei lanci di ausiliari.

Nel caso di interventi con prodotti fitosanitari per la difesa, utilizzare formulati autorizzati in etichetta per queste patologie e non superare le dosi massime consentite. Prima di eseguire gli interventi tagliare il prato sottostante al filare qualora vi siano essenze in fiore; quest'operazione va svolta fuori dal volo delle api. Trattare in giornate miti, senza vento e nelle prime ore del mattino o in tarda serata per rispettare il volo degli insetti pronubi.



Ingrossamento frutti di mora

CILIEGIO

Stadio fenologico

La cultivar Kordia è in raccolta nelle zone tardive.

In questa fase la *Drosophila suzukii* risulta l'avversità più pericolosa.

Negli impianti chiusi con la rete antinsetto è molto importante la gestione della rete, controllando il suo corretto posizionamento fino alla fine della raccolta.

È possibile effettuare un trattamento insetticida sulla varietà Regina, dopo la raccolta di Kordia, nel rispetto dei tempi di carenza dei singoli prodotti fitosanitari.

VITE

Stadio fenologico

Nelle zone di fondovalle e bassa collina siamo mediamente nella fase fenologica di chiusura grappolo, in anticipo di circa una settimana rispetto al 2025.

Peronospora e oidio

Sui testimoni non trattati, al momento, la diffusione di peronospora è in genere molto bassa, mentre quella dell'oidio in aumento soprattutto nelle zone sensibili a questo fungo.

I vigneti trattati risultano generalmente esenti da infezioni su foglie e grappoli.

Nelle zone più precoci, sulle varietà impiegate per base spumante siamo prossimi alla chiusura dei trattamenti fitosanitari.

Fitoplasmi

Da alcune settimane sono ben visibili i sintomi di fitoplasmosi (flavescenza dorata), si ribadisce l'importanza di un **attento e costante monitoraggio dei vigneti e di una tempestiva eliminazione delle piante sintomatiche**.

Contenimento del Legno nero (fitoplasma della vite)

Fino alla vendemmia evitare di tagliare l'erba nel vigneto e sui bordi per non indurre l'insetto vettore del Legno nero, *Hyalesthes obsoletus* (presente principalmente su ortica, convulvolo e artemisia), a spostarsi sulle viti durante il periodo di volo degli adulti (in alternativa può essere lasciata almeno una fascia centrale non sfalcata nell'interfilare delle pergole o sfalcare a file alterne nei filari). I vigneti di Chardonnay, soprattutto gli impianti giovani, sono molto suscettibili a questa patologia.


MAIS

Nei giorni scorsi sono state posizionate le trappole cromotropiche gialle per il monitoraggio della *Diabrotica virgifera virgifera*. Questo insetto, catturato per la prima volta in Trentino nel 2003, è diffuso in tutte le aree coltivate a mais della nostra provincia.

È un coleottero originario del Nord America, della stessa famiglia della dorifora della patata, che si differenzia da quest'ultima per essere un abile volatore.

Il danno più importante è quello causato dalle larve che si sviluppano alimentandosi di radici di mais; pertanto, determinano lo schianto delle piante che risultano più o meno instabili a seconda del tipo di attacco e della varietà. Le vecchie varietà di mais da polenta risultano più sensibili rispetto agli ibridi commerciali.

Il **metodo di contenimento** più efficace è quello di avvicendare la coltivazione e interrompere la monosuccessione, infatti, la diabrotica depone le uova nei campi di mais; quindi, sarà sufficiente



Adulto di diabrotica



non far seguire il mais al mais per ridurre drasticamente la popolazione del fitofago su quella superficie.

L'avvicendamento colturale è sempre auspicabile anche per prevenire problemi di fertilità del suolo (stanchezza) e ridurre le difficoltà di controllo delle infestanti.

Indicazioni generali

Rispettare le prescrizioni previste dal Reg. n. 6-59/Leg del 23 febbraio 2017 per l'esecuzione dei trattamenti in prossimità delle **aree specifiche e dei luoghi sensibili**.

Nelle zone di rispetto idrogeologico dei **punti di captazione delle acque per il consumo umano** utilizzare solo i prodotti consentiti (Deliberazione GP n. 765 del 5 maggio 2023 e n.1205 del 2 agosto 2024), maggiori dettagli su https://ctt.fmach.it/Divulgazione/Fondazione-Mach-Notizie/FONDAZIONE-MACH-NOTIZIE-GENERALE-N.-2_2023

Rispettare le misure previste per la **tutela delle acque superficiali** (Deliberazione GP n. 736 del 12 maggio 2017).